EDICIÓN ESPAÑOLA

ENERO/FEBRERO 2002 VOLUMEN 1 NÚMERO 1

saned SANIDAD EDICIONES

Evidence-Based Medicine

Presentación 53
Editorial 54
Propósito y procedimiento 55
Otros artículos resumidos en *ACP Journal Club* 56
Cuaderno de MBE 57
Rincón de recursos 59

Terapéutica
Las medias elásticas de compresión durante los vuelos de larga duración evitaron el desarrollo de trombosis venosa profunda 61
Las variables de estudio del desarrollo a los tres años de edad fueron similares con timpanostomía precoz y tardía por otitis media 62
Revisión: la aspirina reduce la incidencia de coronariopatías en personas con riesgo 63
Bucindolol redujo la mortalidad y la hospitalización por causas cardiovasculares en la insuficiencia cardíaca crónica avanzada 64
Carvedilol redujo la mortalidad y la hospitalización en la insuficiencia cardíaca crónica grave 65
Con los stents se consiguieron resultados clínicos similares pero más revascularización repetida que con la cirugía de bypass en la enfermedad multivascular 66
Gemfibrozil redujo el riesgo de ictus en hombres con coronariopatías y niveles bajos de colesterol-HDL 67
Las variaciones en la dieta y la actividad física evitaron la diabetes mellitus tipo 2 en personas con intolerancia a la glucosa 68
Un baño en agua templada no redujo el uso de analgesia farmacológica durante la primera fase del parto 69
La administración prenatal y postnatal de *Lactobacillus GG* redujo la incidencia de dermatitis atópica en el recién nacido 70
La vacuna conjugada *Salmonella typhi* Vi redujo la incidencia de fiebre tifoidea en niños de 2 a 5 años 71
La cirugía fue más eficaz que la ortesis en el hallux valgus 72
Revisión: las intervenciones cognitivas y emocionales combinadas pueden influir en la salud de los pacientes 73
Un programa de ejercicios dirigido por una enfermera en el domicilio redujo las caídas y lesiones graves en pacientes de 80 años o más 74
Revisión: los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos mejoran los resultados de pacientes con demencia y de sus cuidadores 75
Revisión: la terapia con antidepresivos y benzodiacepinas consigue menos abandonos de tratamiento y reduce la gravedad de la depresión mayor 76
La hierba de San Juan no redujo las puntuaciones de la depresión más que el placebo 77
Revisión: la melatonina oral reduce el *jet lag* 78

Diagnóstico
Las escalas cortas fueron tan eficaces como las escalas largas para el cribaje de la depresión en pacientes ancianos 79
El resultado negativo de la cuantificación del dímero D en látex ayudó a descartar el tromboembolismo venoso 80

Economía
Las pruebas de detección de *Helicobacter pylori* y la endoscopia fueron menos eficientes que el tratamiento habitual de los pacientes con dispepsia 81

Mejora de la calidad
Revisión: algunas intervenciones son eficaces para reducir los errores médicos 82
Un programa polifacético diseñado especialmente para centros de medicina familiar por capitación mejoró el uso de los procedimientos de cuidados preventivos 83

Guía de predicción clínica
Para predecir la supervivencia después del alta tras reanimación cardíaa en el hospital la ayuda a la decisión clínica fue precisa 84

Sección española
Propósito y procedimiento de la sección española 86
La administración precoz de atenolol o de captopril preserva de modo similar la función ventricular tras el infarto agudo de miocardio anterior 87
Metotrexato en terapia combinada reduce la dosis de corticoides y las recurrencias de la arteritis de células gigantes 89
Eficacia y seguridad de dipirona (metamizol) *versus* tramadol en el manejo del dolor post-histerectomía 91
La olanzapina es más eficaz que el haloperidol a corto plazo, en esquizofrenia, tanto globalmente como en pacientes con síntomas negativos 93
Glosario 95

ACP ASIM American College of Physicians American Society of Internal Medicine

BMJ Publishing Group

semFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

evidem consultores S.L.