

Evidence-Based Medicine

EDICIÓN ESPAÑOLA

Sumario

Propósito y procedimiento	103	Revisión: los antibióticos aumentan moderadamente los porcentajes de remisión de la conjuntivitis bacteriana aguda	120
Otros artículos resumidos en ACP Journal Club	104	El complemento dietético con fibra de psilio o goma arábica redujo la incontinencia fecal en adultos de la comunidad.....	121
Cuaderno de MBE	106	El 17 β -estradiol redujo los síntomas depresivos y somáticos de mujeres perimenopáusicas.....	122
Rincón de recursos	108	El tratamiento interpersonal psicodinámico breve después de un envenenamiento deliberado redujo la ideación suicida y la autolesión.....	123
Terapéutica		El apoyo de otra madre y de un especialista infantil redujo la ansiedad de las madres con hijos con enfermedades crónicas.....	124
Revisión: la vacuna de la varicela es eficaz en niños	110	El tratamiento del reflujo gastroesofágico con cirugía alivió los síntomas pero redujo la supervivencia más que el tratamiento médico	125
Oseltamivir fue seguro y eficaz para la profilaxis de la gripe en ancianos frágiles.....	111	Revisión: los cannabinoides y la codeína ejercen efectos similares sobre el alivio del dolor pero los cannabinoides generalmente producen efectos secundarios psicotrópicos.....	126
Revisión: el placebo ejerce más efecto que el no tratar sobre las variables de estudio subjetivas continuas y el tratamiento del dolor.....	112	Revisión: los cannabinoides controlan las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia pero aumentan el riesgo de efectos secundarios.....	127
Omalizumab redujo el uso de corticosteroides inhalados y las exacerbaciones del asma alérgica de la infancia	113	Pronóstico	
Revisión: los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen la progresión de la enfermedad renal no diabética.....	114	En niños infectados por VIH se observó un retraso en la progresión de la enfermedad después del primer año de vida.....	128
La angiografía coronaria previa al alta fue más eficaz que la prueba de esfuerzo para reducir las visitas al hospital después de un dolor torácico de bajo riesgo..	115	Las mujeres con el síndrome de cintura pélvica durante el embarazo tuvieron dos años después del parto más veces dolor pélvico que las mujeres con otro dolor pélvico	129
El carvedilol redujo la mortalidad y morbilidad por infarto de miocardio en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo	116	Etiología	
Un servicio de vigilancia domiciliaria del paciente fue más eficaz que la atención habitual en pacientes con hipertensión esencial.....	117	Los episodios cardiovasculares aumentaron en pacientes con riesgo cardiovascular alto que tenían albuminuria.	130
La anticoagulación oral de corta duración para el tromboembolismo venoso es equivalente a la prolongada.....	118		
Los tratamientos anticoagulantes orales de tres meses y de un año de la trombosis venosa proximal idiopática fueron similares	119		

Mejora de la calidad

La remisión a un médico generalista o a una enfermera mejoró la valoración de los pacientes con coronariopatías 131

Guía de predicción clínica

Las puntuaciones Framingham sobreestimaron

el riesgo de coronariopatías en series de pacientes japoneses, norteamericanos y nativos americanos..... 132

Un modelo de predicción clínica sirvió para diagnosticar la faringitis por estreptococos β -hemolíticos del grupo A en niños 133

Glosario 145