

Evidence-Based Medicine

EDICIÓN ESPAÑOLA

Sumario

Propósito y procedimiento	151	Revisión: en estudios sobre los efectos cardiovasculares de los inhibidores selectivos de COX-2 se encontraron resultados mixtos.....	169
Otros artículos resumidos en ACP Journal Club	152	Revisión: el tratamiento prolongado con litio reduce el riesgo de suicidio en los trastornos afectivos mayores	170
Cuaderno de MBE	153	Revisión: el tratamiento de resolución de problemas después de autolesión mejora la depresión, la desesperanza y los problemas personales.....	171
Rincón de recursos	157	Revisión: las terapias de conducta parecen ser los tratamientos más prometedores en el síndrome de fatiga crónica	172
Terapéutica		Revisión: los mucolíticos reducen las exacerbaciones, los días de enfermedad y el uso de antibióticos en la bronquitis crónica y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica	173
La dieta denominada Procedimientos Dietéticos para Detener la Hipertensión redujo la presión arterial sistólica en estadio 1 en pacientes con hipertensión sistólica aislada	159	El zinc o la vitamina A redujeron la diarrea en niños pobres de Bangladesh.....	174
El tratamiento combinado con indapamida y perindopril redujo el riesgo de repetición del ictus pero no lo hizo perindopril solo.....	160	Una dieta de arroz con banana verde o pectina reduce la diarrea infantil más que una dieta de arroz solo.....	175
El tratamiento con clopidogrel más aspirina fue eficaz en los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST pero aumentó las hemorragias	161	La fisioterapia, el aerobio y los aparatos de entrenamiento reducen la intensidad y la frecuencia de dolor crónico de la zona inferior de la espalda	176
Una intervención desarrollada por una enfermera redujo los factores de riesgo, la ansiedad y la depresión en pacientes que estaban esperando un BPAC.....	162	Revisión: los antidepresivos mejoran el dolor de cabeza en pacientes con cefalea crónica	177
La revascularización redujo la angina y produjo menos efectos secundarios adversos que la atención médica óptima en ancianos con angor pectoris	163		
Los tratamientos continuo e intermitente con sibutramina fueron igualmente eficaces a las cuarenta y cuatro semanas para la reducción del peso en la obesidad	164	Diagnóstico	
El tratamiento con levodopa más carbidopa antes de la fisioterapia aumentó la recuperación motora tras un ictus	167	Revisión: las imágenes de angiografía TC y de resonancia magnética son las pruebas mejores y menos agresivas en la estenosis de la arteria renal....	178
Revisión: la trombólisis aumenta la muerte y la hemorragia intracraneal a corto plazo pero reduce la muerte y la dependencia a largo plazo	168	Las concentraciones del péptido natriurético B tienen gran sensibilidad y especificidad para detectar las alteraciones de la función ventricular	179

Pronóstico

Los niños menores de un año infectados de meningitis tuvieron mayor riesgo de discapacidad a los cinco años 180

Etiología

Una exposición de bajo grado al alcohol en el periodo prenatal se asoció con resultados de conducta adversos en niños de 6 a 7 años de edad..... 181

Mejora de la calidad

Revisión: los programas multidisciplinarios de manejo de las coronariopatías mejoran el proceso de atención y reducen los ingresos en el hospital..... 182

Economía

Una vacuna intranasal para la prevención de la gripe en niños sanos fue coste-eficaz..... 183

Diagnóstico diferencial

Una exploración clínica secuencial estandarizada identificó las causas probables del síncope en el 69% de los pacientes..... 184

Glosario 192