

R.C.P. BASICA PEDIATRICA

Lactante (< 1 año)

Pequeñas sacudidas
Pellizcarlo
Hablarle en voz alta o gritarle

Preescolar (1-4)

Escolar (5-12)

Adolescente > 12 años

COMPROBAR INCONSCIENCIA
Pedir ayuda a personas
cercanas si es necesario

ABRIR LA VIA AEREA
*Maniobra frente-mentón
*Elevación Mandibular

COMPROBAR LA RESPIRACION
Ver, oír y sentir (Máximo 10 seg)

RESPIRA

POSICION
DE SEGURIDAD

NO RESPIRA

VENTILAR

*5 ventilaciones de rescate (2 eficaces)
*Si no se eleva el tórax:
-Reabrir la vía aérea
-5 ventilaciones mas
*Si no hay éxito:
-Tratar como obstrucción de la vía aérea

Boca a boca-nariz

Boca a boca

COMPROBAR S.CIRCULACION
(Máximo 10 seg)

SI

VENTILAR
(Respiración eficaz)

Palpar el pulso braquial
Iniciar compresiones
torácicas si la frecuencia
es <60 lat./min).

NO

MASAJE CARDIACO

*5 Compresiones/ 1 ventilación
*>8 años: 15/2.
*100 compresiones/min

Con dedos 3ºy 4º, 1 cm por
debajo de la línea intermamilar
Profundidad: 1/3

Talón de la mano en el
tercio inferior del esternón
Profundidad: 1/3

***Agotamiento *Ayuda *Pulso y Respiración**